

WELCHER PATIENT IST FLUGUNFÄHIG?

Sehr geehrte Patienten,

Als Minimalanforderung für Flugfähigkeit gilt, daß der Patient 80 Meter ohne Hilfe gehen, bzw. symptomfrei zehn bis zwölf Treppenstufen steigen können sollte. Dies können Sie bequem selbst testen. Ist Ihnen dies nicht möglich, sollten Sie auf eine Flugreise verzichten.

Flugunfähig sind Patienten mit:

- entgleister Herzschwäche (dekompensierter Herzinsuffizienz)
- instabilen Brustschmerzsymptomen (instabiler Angina pectoris)
- Herzinfarkt (der nicht älter als zwei Wochen ist)
- Herzbypass- und Herzklappenoperation (die nicht älter als 2 – 4 Wochen sind)
- unkontrollierten Herzrhythmusstörungen
- Blutarmut mit einem Hämoglobin (Hb)-Wert < 9 mg/dl
- schwerem Lungenhochdruck (pumonale Hypertonie)
- Herz-Klappen-Fehlern mit Rechts-Links-Shunt
- unkontrolliertem Bluthochdruck (arterielle Hypertonie).

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. med. Oliver Kohl

(Nach MMW-Fortschr. Med. 147, 2005: 625-627)